

表75-1 再建良好・病者意識弱群と再建不良好・病者意識強群の比較(その1)

	透析歴					透析形態				健康不良			健康像	
	1年未満	3年未満	5年未満	10年未満	10~16年	施設午前	施設午後	施設夜間	家庭透析	健康不良	医学的健康 評価優位	主観的健康 評価優位	健康良好	
再建良好・弱		1(4.8)	2(9.5)	12(57.1)	6(28.6)	4(19.0)	4(19.0)	4(19.0)	9(42.9)	1(5.3)	2(10.5)	6(31.6)	10(52.6)	
再建不良好・強	3(12.0)	9(36.0)	4(16.0)	6(24.0)	3(12.0)	13(52.0)	4(16.7)	8(32.0)		11(45.8)	3(12.5)	5(20.8)	5(20.8)	

注) ()内は、表頭の項目ごとに各群で占める割合である。ただし、不明がある場合は、除いて計算した。以下同じ。

表75-2 再建良好・病者意識弱群と再建不良好・病者意識強群の比較(その2)

	体重管理スコア			カロリー摂取			自己管理の基本的姿勢			
	かなり	少し	ほとんど してない	かなり	少し	特には してない	データと 体調	医療スタッフ の指導	家族任せ 未修得	その他
再建良好・弱	8(38.1)	11(52.4)	2(9.5)	4(19.0)	12(57.1)	5(23.8)	14(66.7)	4(19.0)	1(4.8)	2(9.5)
再建不良好・強	13(52.0)	5(20.0)	7(28.0)	7(28.0)	11(44.0)	7(28.0)	6(24.0)	8(32.0)	10(40.0)	1(4.0)

表75-3 再建良好・病者意識弱群と再建不良好・病者意識強群の比較(その3)

	食事に対する心理類型				健康目的の運動			その他の健康法		
	不満	アヒル アヒル	淡泊	満足	している	止めた	経験無し	している	止めた	経験無し
再建良好・弱		1(4.8)	2(9.5)	18(85.7)	11(52.4)		10(47.6)	4(19.0)	6(28.6)	11(52.4)
再建不良好・強	7(28.0)	8(32.0)	3(12.0)	7(28.0)	4(16.0)	1(4.0)	20(80.0)	3(12.0)	2(8.0)	20(80.0)

表75-4 再建良好・病者意識弱群と再建不良好・病者意識強群の比較(その4)

	調査時の職業				労働日数					趣味・レジャーのタイプ				
	常勤雇用者	臨時・日雇	自営	無職	0日	1~3日	4日	5日	6日以上	不定	A	B	C	D
再建良好・弱	15(71.4)		5(23.8)	1(4.8)	1(4.8)		1(4.8)	11(52.4)	7(33.3)	1(4.8)	9(42.9)	8(38.1)	3(14.3)	1(4.8)
再建不良好・強	8(32.0)	2(8.0)	9(36.0)	6(24.0)	6(24.0)	4(16.0)	4(16.0)	2(8.0)	9(36.0)		4(16.0)	8(32.0)	5(20.0)	8(32.0)

注) 職業、労働日数では学生を除いた。

表75-5 再建良好・病者意識弱群と再建不良好・病者意識強群の比較(その5)

	親しい人間関係領域の数					生活程度					家族との外出機会		
	0	1	2	3	4以上	ランク1	ランク2	ランク3	ランク4	ランク5	週に1度以上	2月に1度以上	それ未満
再建良好・弱	1(4.8)	2(9.5)	5(23.8)	5(23.8)	8(38.1)	8(38.1)	4(19.0)	8(38.1)		1(4.8)	3(15.0)	14(70.0)	3(15.0)
再建不良好・強	2(8.0)	8(32.0)	10(40.0)	4(16.0)	1(4.0)	2(8.0)	1(4.0)	6(24.0)	10(40.0)	6(24.0)	2(8.7)	11(47.8)	10(43.5)

注) 家族に関連した項目は、調査時に同居家族がいた者についてのみである。以下同じ。

表75-6 再建良好・病者意識弱群と再建不良好・病者意識強群の比較(その6)

	家族団らんの機会				家族の協力・理解		
	ほぼ毎日	週に1度以上	月に1度以上	それ未満	かなり	まあ	あまり
再建良好・弱	11(55.0)	6(30.0)	3(15.0)		16(80.0)	3(15.0)	1(5.0)
再建不良好・強	8(36.4)	4(18.2)	5(22.7)	5(22.7)	7(30.4)	12(52.2)	4(17.4)